

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLF 21-7-76190560

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. : (88) 36.24.87

C.P.P.A.P. n° 523 AD

ABONNEMENT ANNUEL 50 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Bulletin n° 98

19 juillet 1976

SOINS A DONNER AUX CULTURES APRES UNE CHUTE DE GRELE

SUR VIGNE

- Lorsqu'il reste un peu de récolte, ne pas toucher aux rameaux porteurs, mais tailler court tous les autres quand ils sont fortement mutilés.
- La taille doit s'effectuer dans le noeud.
- Bien entendu, apporter tous les soins culturaux assurant une bonne végétation.

Effectuer les traitements de protection contre le mildiou, en raison de la grande sensibilité des repousses qui vont apparaître à un moment où la maladie est en général virulente.

SUR ARBRES FRUITIERS

- sur pruniers, effectuer aussitôt un traitement avec une bouillie bordelaise à 1 % ou un produit cuprique à raison de 250 g de cuivre métal/hl.
- sur les arbres sensibles au cuivre (pommiers, poiriers, pêcheurs notamment), traiter avec l'un des produits conseillés contre les tavelures.

Ces traitements (vigne et arbres fruitiers) présentent le maximum d'intérêt lorsqu'ils sont effectués dans les 20 heures qui suivent la chute. Au-delà de 36 heures, la protection est aléatoire. Cette période est toutefois prolongée si l'on utilise les fongicides doués d'action endotherapique (bénomyl, carbendazim, méthylthiophanate).

Sur la vigne, ils permettent en particulier de prévenir le Rot-blanc (maladie de la grêle) qui évolue sur les grains déjà bien développés. Employer soit le captane à 500 g de m. a./hl, soit le phaltane à 300 g de m. a./hl. Ce champignon se trouve à l'état latent dans les vignes âgées principalement.

RENOUVELLEMENT DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE

Nous rappelons qu'il est généralement admis qu'une forte pluie d'orage (15 à 20 mm d'eau tombée en 15 à 20 minutes) ou une pluie fine, mais continue pendant une dizaine d'heures (20 à 30 mm d'eau) peut entraîner un lessivage préjudiciable à l'efficacité du traitement lorsqu'il s'agit d'un produit d'adhésivité moyenne.

Le renouvellement du traitement s'impose donc chaque fois que l'on a enregistré de telles précipitations, sans attendre un nouvel avis de la Station.

ARBRES FRUITIERS

- POMMIER - POIRIER -

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les captures en pièges sexuels restent faibles, sauf à ROTTELSHEIM (67) où les prises de papillons sont très fortes depuis le 9 juillet.

La deuxième génération est très en avance cette année. Les conditions atmosphériques étant favorables à l'activité des papillons, des dégâts sévères sont à attendre, du moins dans l'immédiat, dans la zone arboricole de ROTTELSHEIM.

Dans cette dernière région, un traitement insecticide devra être effectué dans les meilleurs délais.

Dans toutes les autres régions, la protection des vergers est conseillée dans la période du 24 au 27 juillet.

ARAIGNEES ROUGES

Suivre très attentivement le développement de ces acariens dont les populations sont en nette augmentation, dans les vergers de pommier insuffisamment protégés au printemps.

En cas de nécessité, profiter du traitement contre le carpocapse pour intervenir en traitement mixte. Apporter suffisamment de bouillie, de façon à ce que la pulvérisation mouille bien l'ensemble de la végétation.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

Le Chef de Circonscription Adjoint
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. GENNATAS